



Levenscyclus en onderscheid (kleine) bessenbladwesp

In Tabel 1 wordt het verschil tussen de bessenbladwesp en de kleine bessenbladwesp weergegeven. Er bestaat nog een derde bladwesp, namelijk de *Nematus leucotrochus*. Die heeft maar één generatie en komt minder frequent voor.

Tabel 1: Bessenbladwesp versus kleine bessenbladwesp

Bladwesp	Bessenbladwesp	Kleine bessenbladwesp
Latijnse naam	<i>Nematus ribesii</i>	<i>Pristiphora appendiculata</i>
Overwintering	Verpopping in cocon in de grond	Verpopping in cocon tussen bladeren of in de grond
Start activiteit	(begin) maart	(begin) maart
Grootte adult	6 – 7 mm (♀>♂)	4,5 – 5,5 mm (♀>♂)
Uiterlijk adult	Typische gele buik, zwarte stip op vleugel 	Kleiner dan de bessenbladwesp en zonder typische gele buik, zwarte stip op vleugel 
Legplaats eitjes	Onderkant van het blad op rijtjes 	Onderkant blad tussen het bladgroen 
Bastaardrups	Groen/grijs/blauw met zwarte stippen en gele segmenten 	Groen zonder zwarte stippen 
Generaties	Meerdere generaties mogelijk i.f.v. temperatuur (1-2)	Meerdere generaties mogelijk i.f.v. temperatuur