

Bijlage: eiwitanalyses wintermengteelten 2013-2014


Het volledige verslag van de proef in het vorige seizoen vind je op volgende link:

<http://www.ccbt.be/?q=node/436>

Op moment van publicatie waren de eiwitanalyses nog niet beschikbaar. Hieronder vind je de definitieve opbrengsttabel en samenvattende grafiek (voedererwt: te forse groei met legering, uitval en verlies door vogels tot gevolg).

Tabel 1: Korrelopbrengst, vochtgehalte en eiwitopbrengst van de verschillende mengteelten bij oogst op 27 juli 2014, Lo-Reninge

obj	Triticale		Eiwitgewas		% vocht		Opbrengst (15% vocht)			Eiwit %		Ruw eiwit	
	ras	kg/ha	soort	ras	kg/ha	graan	eiwit	graan	eiwit	totaal	graan	eiwit	kg/ha
1	Borodine	200	Voedererwt 30 z/m ²	Arkta	45	14,7	16,8	3676	1952	5628	10,3	18,7	744
2				Assas	50	15,0	16,9	3310	1518	4828	10,4	20,8	659
3				EFB 33 (bio)	40	15,1	17,7	3805	1798	5604	10,7	20,1	768
4	Borodine	150	Winterveldboon 35 z/m ²	Divia (bio)	145	14,5	16,7	3680	4046	7726	10,3	23,1	1312
5				Hiverna (bio)	220	23,7	33,5	2851	3251	6102	13,3	23,1	1131
6				Irena	165	14,4	14,5	4032	4255	8288	9,6	24,3	1423
7				Organdi	175	14,4	15,2	6513	2034	8547	8,6	25,1	1069



Figuur 1: Totale korrelopbrengst (kg/ha) voor de verschillende mengteelten en opbrengst Borodine uit aanpalend rassenproef triticale bij oogst op 27 juli 2014, Lo-Reninge

